

Checklist Risico Crisisdienst (Nijman&Penterman, 2009)

(in te vullen vóór het contact met patiënt)

Datum.../.../ Dag:..... Tijdstip:..... Medewerker:.....

Door wie is de crisisdienst ingeschakeld?

- Huisarts/CHP
- GGD-arts
- Collegae Dimence
- Patiënt zelf
- Naasten van patiënten Dimence
- Anderen:

Eerste inschatting toestandsbeeld/ problematiek

- Psychotisch
- Manisch/ ontremd
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Depressief/ suïcidaal
- Onder invloed van drank en/of drugs
- Onduidelijk toestandsbeeld

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Risicoverhogende patiëntgebonden factoren?

- Geen
- Onbekendheid met patiënt
- Eerdere agressie van patiënt
- Eerder gedwongen opname(n) in verleden (gevaarcriterium)
- Mogelijk paranoïde waandenkbeelden
- Mogelijk imperatieve hallucinaties
- Onvoorspelbaarheid door drank en/of drugs

Risicoverhogende omgevingsfactoren?

- Geen
- Onbekendheid met woonsituatie patiënt
- Problemen in het systeem van patiënt
- Mogelijk (andere) gevaarlijke personen in omgeving/ intolerante buurt
- Mogelijk gevaarlijke huisdieren
- Mogelijk wapens in de woning of buurt van patiënt
- Andere omgevingsgebonden risicofactoren, n.l:

Hoe hoog schat U, op basis van de thans beschikbare informatie, de kans in dat patiënt, of diens omgeving, tijdens het consult agressief naar U zal reageren?

Zeer laag <----->Zeer hoog

Zijn er preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van gevaarlijke situaties?

- Meer informatie opvragen
- Patiënt naar andere locatie laten komen/ brengen
- Patiënt zien op politiebureau
- Assistentie vragen van politie tijdens consult
- Afspraken maken over telf. contact met collegae
- Zorgen voor aanwezigheid van familie/ kennissen
- Patiënt met collega gaan zien (altijd afwegen of politie-inzet noodzakelijk is)
- Anders, n.l:

Wat is de precieze locatie waar U patiënt gaat zien?

Indien de patiënt tijdens het consult agressie vertoont, vergeet dan niet het SOAS formulier in te vullen!